

# AVES DE LOS BOSQUES DE RIBERA




Los bosques de ribera son uno de los lugares que acogen una mayor biodiversidad de especies animales y vegetales. Este papel queda todavía más de manifiesto en zonas esteparias, donde el agua es un bien escaso y la presencia de ríos y la vegetación de ribera asociada a los mismos se convierte en un importante punto de concentración de la vida animal en muchos kilómetros a la redonda.



Agateador común

La ZEPA Camino de Santiago es atravesada en sentido Noreste por el río Ucieza. Este pequeño curso fluvial tiene una longitud de 71 kilómetros y una cuenca de aportación de 659 km<sup>2</sup>. Su nacimiento tiene lugar en Fuente Cieza, un pago de la pequeña localidad palentina de Villasur; tributando sus aguas al río Carrión en la localidad de Monzón de Campos.

Aunque el Ucieza es un río profundamente alterado debido a varios proyectos de encauzamiento, todavía presenta algunos bosques de ribera en un aceptable estado de conservación. Álamos negros, álamos blancos, sauces, fresnos, espinos albares o cornejos son las especies arbóreas y arbustivas más frecuentes. Cuenta



Cuco

además con extensas manchas de vegetación palustre, principalmente carrizales, que alternan con láminas de aguas abiertas que forman pequeños rápidos, remansos y pozas que sirven de refugio a un numeroso grupo de fauna vertebrada e invertebrada.

Los meses de primavera y verano (de abril a julio) son los más recomendables para la observación de las aves al coincidir con el periodo reproductor. Durante ese periodo los sotos del



Carricero tordal



Paloma torcaz

Ucieza se llenan con los melódicos cantos de especies insectívoras como el ruiseñor común, curruca capirotada, curruca zarcerera, mosquitero papialbo, zarcero común, carbonero común o herrerillo común. Los carrizales y zonas de



Chochín

vegetación palustre son el lugar idóneo para observar especies como los carriceros comunes y tordales, ruiseñor bastardo, pájaro moscón o buitrón. Otras especies no insectívoras como los jilgueros, verderones

comunes, verdecillos o escribanos soteños también son nidificantes habituales en los bosques riparios. Por último, además de los passeriformes, los sotos son el lugar adecuado para especies de rapaces como el milano negro, el ratonero común, el águila calzada o el alcotán, compartiendo lugar con otras especies forestales como los pájaros carpinteros, representados por el pico picapinos, el pito real o el torcecuello.



Pito real



Carbonero común



Petirrojo europeo



Herrerillo común



Tórtola común



Verdecillo



Gorrión molinero